



septembre 2017

Fiche Flavescence dorée

Origine

Maladie provenant des attaques d'un phytoplasme (sorte de bactérie) apporté au cep de vigne par piqure d'un insecte porteur la cicadelle principalement par l'espèce « Schaphoideus titanus ».

Cette maladie est incurable et l'issue est la mort du cep en 2 à 3 ans.

Extrêmement contagieuse, la lutte est organisée au niveau national. Aujourd'hui le vignoble français est touché à 70% environ.

Symptômes

Une observation de la présence des insectes et des ceps de vigne est indispensable.



- Enroulement des feuilles vers l'intérieur
- coloration des feuilles à partir d'août en jaune pour les Blancs et en rouge soutenue pour les Rouges
- dessèchement partiel ou total des grappes
- non-aoûté des rameaux

Nota : confusion possible avec d'autres piqures de cicadelles nos porteuses du phytoplasme (un renflement est visible sur le sarment dans ce cas); confusion aussi suite à carence en potasse.

Actions et Traitement la découverte d'un foyer doit être déclarée à la direction de l'agriculture locale ou au Fredon.

- coupe du rameau touché le plus rapidement possible, identification du cep et surveillance – arrachage des ceps contaminés voir de la parcelle.
- traitement avec insecticide de synthèse ou pyrètre pour les bio